


อาการข้างเคียง

หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่อาจเกิดขึ้น

อาการข้างเคียงไม่รุนแรง

อาการข้างเคียงรุนแรง



อาการแพ้วัคซีน



ควรเฝ้าระวังสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 จนครบ 30 นาที อย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีอาการรุนแรงควรรีบพบแพทย์ทันที

ประโยชน์

จากการได้รับวัคซีน



ป้องกัน
การติดโควิด




เกิดภูมิคุ้มกันหมู่
ของชุมชน



ทุกคนปลอดภัย
จากโควิด-19



ยับยั้ง
การแพร่ระบาด



ลดความรุนแรง
หากติดเชื้อ

โคกมั่งงอย

พร้อมใจ

ฉีดวัคซีน

สู้โควิด-19



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย
อำเภอหนองเสือ จังหวัดชัยภูมิ

ด้วยความปราถนาดีจาก อบต.โคกมั่งงอย

รู้จัก



วัคซีนโควิด

วัคซีน คือสารชีววัตถุที่ฉีดเข้าสู่ร่างกายเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันโรค



รูปแบบของวัคซีนโควิด

1. ชนิด mRNA

คือ การใช้ **สารพันธุกรรม RNA ไวรัส** ส่วนที่สร้างโปรตีนหนามแหลม แล้วห่อหุ้มด้วยไขมันเพื่อให้เซลล์สร้างหนามแหลมโปรตีนมากกระตุ้นสร้างภูมิต้านทาน

- มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้สูง
- ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิ -70 C ถึง -20 C ทำให้ขนส่งได้ยาก
- ราคาแพง

2. ชนิดไวรัสเวกเตอร์

คือ การใช้ **สารพันธุกรรมส่วนหนามแหลมของไวรัสที่ก่อโรคโควิด-19** ผสมไว้ใน **ไวรัสชนิดอื่นที่ไม่ก่อโรคในมนุษย์**

- สามารถผลิตได้จำนวนมากอย่างรวดเร็ว
- ราคาถูกกว่า
- เก็บรักษาได้ง่าย อุณหภูมิ 2-8 C

3. ชนิดเชื้อตาย

เพราะ **เชื้อไวรัส** ในเซลล์เพาะเลี้ยงจำนวนมาก ทำให้ตายด้วยสารเคมีทำให้บริสุทธิ์ และใส่รวมเข้ากับสารกระตุ้นภูมิ

- ใช้ได้กับคนที่มีภูมิต้านทานต่ำได้ เพราะเป็นเชื้อที่ไม่ก่อโรค
- มีความยากในการผลิต ต้องใช้สถานที่ผลิตที่มีความปลอดภัยสูง ทำให้มีราคาแพง

ข้อปฏิบัติ ก่อนฉีดวัคซีน



ข้อมูลสำคัญที่ควรแจ้งหรือปรึกษาแพทย์

1. มีโรคประจำตัวหรือมียาที่ต้องรับประทาน
2. มีประวัติแพ้ยาหรือวัคซีน
3. อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์

ข้อปฏิบัติ วันที่เข้ารับวัคซีน



ข้อปฏิบัติ หลังฉีดวัคซีน

